

OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV

Datum: 11. 6. 2015

Številka: 6

Vinska trta je trenutno v fenološki fazi polnega cvetenja (BBCH 65), sorte hitreje v razvoju pa so že dosegle fenološko fazo BBCH 68 (80% odpadlih cvetnih kapic).

Nevarnost za okužbo s **peronosporo vinske trte** je zaradi sušnega vremena trenutno manjša. V primeru nadaljevanja sušnega obdobja lahko v vinogradih, kjer v preteklih letih ni bilo večjih težav s peronosporo vinske trte, uporabite enega od kontaktnih pripravkov: **Antracol** ali **Antracol WG 70** (2,0 kg/ha) ali **Dithane DG neotec** ali **Dithane M 45** (2,0 kg/ha) ali **Delan 700 WG** (0,5 kg/ha.) ali **Folpan 50 SC** (2L/ha) ali **Folpan 80 WDG** (1,25 kg/ha) ali **Manfil 75 WG** (2,0 kg/ha) ali **Manfil 80 WP** (2,0 kg/ha) ali **Mankoz 75 WG** (2 kg/ha) ali **Mildicut** (3 L/ha) ali **Pinozeb M 45** (2,0 kg/ha) ali **Penncozeb 75 DG** (2,0 kg/ha) ali **Polyram DF** (2,4 kg/ha) ali **Electis 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha).

V primeru uporabe kontaktnih pripravkov presledki med škropljenji ne smejo presegati 7 – 8 dni oz. jih je potrebno prilagajati količini padavin (če pade več kot 30 L/m², je potrebno naslednje škropljenje opraviti pred napovedanimi padavinami) in prirastu mladice.

V primeru napovedanih obilnejših padavin in v vinogradih, kjer se **peronospora vinske trte** pogosteje pojavlja, za naslednja škropljenja proti tej bolezni priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: **Acrobat MZ WG** (2,5 kg/ha) ali **Antracol combi** (2 kg/ha) ali **Alleato 80 WG** (2,5 kg/ha) ali **Curzate M** (2-3 kg/ha) ali **Enervin** (2,5 kg/ha) ali **Emendo F** (1,5 kg/ha) ali **Equation pro** (0,4 kg/ha) ali **Electis** (1,5-1,8 kg/ha) ali **Fantic F WG** (2 kg/ha) ali **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha) ali **Forum star** (1,6 kg/ha) ali **Gett** (1,6 kg/ha) ali **Galben M** (2,5 kg/ha) ali **Melody combi WG 65,3** (1,5 kg/ha) ali **Mikal Flash** (4 kg/ha) ali **Mikal premium F** (3 kg/ha) ali **Momentum F** (4 kg/ha) ali **Momentum trio** (3 kg/ha) ali **Moximate 725 WG** oz. **WP** (1,9 kg/ha) ali **Mildicut** (3 L/ha) ali **Nautil DG** (2,4 kg/ha) ali **Pergado F** (1,6 kg/ha) ali **Pergado MZ** (2,5 kg/ha) ali **Profiler** (3 kg/ha) ali **Profilux** (2 kg/ha) ali **Ridomil gold combi Pepite** (2 kg/ha) ali **Ridomil gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha) ali **Revus** (0,4 – 0,6 l/ha) ali **Sfinga Extra WDG** (1,5-2,0 kg/ha) ali **Valis F** (1,5 kg/ha). Presledki med škropljenji s kombiniranimi pripravki naj ne bodo daljši kot 8-10 dni.

Pripravkom **Revus**, **Profiler**, **Alleato 80 WG** in **Equation pro** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

Za preprečitev okužbe z **oidijem vinske trte** priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: **Crystal** (0,2 l/ha) ali **Collis** (0,4 l/ha) ali **Domark 100 EC** (0,3 l/ha) ali **Dynali** (0,65 l/ha) ali **Falcon EC 460** (0,3 do 0,4 L/ha) ali **Folicur EW 250** (0,03% konc.) ali **Karathane Gold 350 EC** (0,6 l/ha) ali **Kusabi 300 SC** (0,25 L/ha) ali **Luna experience** (0,375 l/ha) ali **Misha 20 EW** (0,23 l/ha) ali **Mystic 250 EC** (0,4 l/ha) ali **Nativo 75 WG** (0,18 kg/ha) ali **Orius 25 EW** (0,3 l/ha) ali **Postalon 90 SC** (1 do 1,25 l/ha) ali **Stroby WG** (0,1-0,2 kg/ha) ali **Talendo** (0,25 l/ha) ali **Talendo extra** (0,13-0,3 l/ha) ali **Tebusha 25% EW** (0,4 l/ha) ali **Topas 100 EC** (0,3 l/ha) ali **Topaze** (0,3 l/ha) ali **Vivando** (0,16 l/ha).

Lahko uporabite tudi pripravka **Cabrio top** (2,0 kg/ha) ali **Universalis** (2 l/ha), ki zaradi kontaktne komponente delujeta tudi proti peronospori vinske trte.

Sredstvom za zatiranje **oidija** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Pepelin** ali **Thiovit jet** (3-8 kg/ha), **Vindex 80 WG** (3-6 kg/ha), **Močljivo žveplo** (0,3 – 0,5%) ali **Cosinus** oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (8 kg/ha – v primeru pojava oidija). Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.



Ameriški škržatek – prenašalec zlate trsne rumenice, se sedaj večinoma nahaja v stadiju ličinke L2. Zaradi nevarnosti insekticidov za čebele in cvetenja vinske trte vas bomo o uporabi insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka pravočasno obvestili.

V primeru pojava **neurij in toče** imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (**Fantic F, Forum star, Melody combi WG 65,3, Sfinga extra WDG, Pergado F, Mikal flash, Ridomil gold combi Pepite, Mikal premium F in podobni**). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali podobnih**. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN