

R · B ·	NAMJENA	NAČIN DJELOVANJA	AKTIVNA TVAR	NAZIV	PROIZVOĐAČ	KON.	MAX. BROJ PRIMJEN A	KARENCA	NAPOMENE
	PLAMENJAČE CRNE PJEGAVOSTI I CRVENE PALEŽI CRNE TRULEŽI	KONTAKTNO (PREVENTIVNO)	75,0 % BAKARNI HIDROKSID	NORDOX 75 WG	SYNGENTA	10-15g na 10 l		35	-PRIJE NASTUPANJA ZARAZE -U FENOFAZI (3- 10 cm)
	PLAMENJAČE CRNE PJEGAVOSTI I CRVENE PALEŽI CRNE TRULEŽI	KONTAKTNO (PREVENTIVNO)	50,0 % BAKARNI HIDROKSID	BLAUVIT	o H. I. Župa Eurochem	0,2 - 0,25 %			NE SMIJE SE MIJEŠATI S INSEKTICIDIMA IZRAZITO KISELE REAKCIJE, DITIOFOSFATNIM INSEKTICIDIMA, FUNGICIDIMA NA OSNOVI DODINA I PROPAMOKARBA, FIZIOTROPIMA NA OSNOVI ETEFONA TE FOLIJARNIM GNOJIVIMA
	PLAMENJAČE CRNE PJEGAVOSTI I CRVENE PALEŽI CRNE TRULEŽI	KONTAKTNO (PREVENTIVNO)	50,0 % BAKARNI HIDROKSID	CHAMPION WG 50	Belchim	20-25 g u 10 l vode		35	
	PLAMENJAČE CRNE PJEGAVOSTI I CRVENE PALEŽI CRNE TRULEŽI	KONTAKTNO (PREVENTIVNO)	35,0 % BAKARNI HIDROKSID	CUPERBLAU Z ULTRA	CINKARNA	20-25 g u 10 l vode		28	
	PLAMENJAČE CRNE PJEGAVOSTI I CRVENE PALEŽI CRNE TRULEŽI	KONTAKTNO (PREVENTIVNO)	34,8 % BAKARNI HIDROKSID	CUPROLINE	Herbos d.d.	0,3 - 0,45 %			
	PLAMENJAČE CRNE PJEGAVOSTI I CRVENE PALEŽI CRNE TRULEŽI	KONTAKTNO (PREVENTIVNO)	20,0 % BAKAR HIDROKSID - KALCIJ SULFAT KOMPLEKS	Bordoška juha 20 WP WP	NUFARM	0,75 % (prije cvatnje) i - 1,5 % POSILIJE		35	
	PLAMENJAČE CRVENE PALEŽI CRNE PJEGAVOSTI	KONTAKTNO (PREVENTIVNO)	BAKAR 35% + CINK 2%	CUPERBLAU Z	CINKARNA	30 g na 10 l 100 g /10 l pred kretanje vegetacije 35g na 10 l	3	35	
	PLAMENJAČE I CRNE PJEGAVOSTI	KONTAKTNO (PREVENTIVNO)	DITIANON 700 G/KG	DELAN 700 WDG	BASF	5 g / 10 l	6	49	
	PLAMENJAČE I PEPELNICE CRNE PJEGAVOSTI I CRVENE PALEŽI	SISTEMIČNO (PREVENTIVNO)	93,5 G/L AZOKSISTROBIN 500 G/L FOLPET	UNIVERSALIS	SYNGENTA	25 ml / 10 l		42 VINSKE 35 STOLNE	RADNA ZABRANA: 24 SATA; 5 DANA ZA REZIDBU

	PLAMENJAČE (POPRAVNO BOTRITIS)	SISTEMIČNO I KONTAKTNO	50 G/L MANDIPROPAMID 400 G/L FOLPET	PERGADO F	SYNGENTA	0,25 kg /100 lit 25 g /10 lit	4 PUTA U RAZMAKU OD 8-14 DANA	42 VINSKE 32 STOLNE	PERGADO F I PERGADO MZ VRLO SE TEŠKO ISPIRU KIŠOM TE OSIGURAVAJU DUGO DJELOVANJE (8 -12 DANA)
	PLAMENJAČE	SA IZRAZITIM KURATIVNIM DJELOVANJEM PROTIV PLAMENJAČE NA VINOVOJ LOZI	CIMOKSANIL 450 G/KG	CYMBAL W		0,2-0,25 kg/ha			- CYMBAL WG 0,2- 0,25 KG/HA + MILDICUT 25 SC 3 L/HA - CYMBAL WG 0,2-0,25 KG/HA + OPTIX R 4 L/HA
	PLAMENJAČE	SISITEMIK	FOSETIL 200 G/KG TRIBAZIČNI BAKRENI SULFAT 150 G/KG	OPTIX RA		5 kg/ha (500 g/1000 m2)	4 PUTA U RAZMAKU OD 10-12 DANA	28	
	PLAMENJAČE	KOMBINIRANI	30,0 CIMOKSANIL, 22,5 FAMOKSADON	EQUATIO PRO	DUPONT	0,4 kg/ha	DO 4 PUTA	28	
	PLAMENJAČE	PREVENTIVNO	CIAZOFAMID 25 G/	MILDICUT 25 SC	ISK	2,5 l – 4 L / HA	DO 8 PUTA U RAZMAKU OD 12-14 DANA	21 VINSKE 28 STOLNE	
	PLAMENJAČE	SISTEMIK	U %: 80,00 FOSETIL	ALIFIL	Industrias Afrasa, S.A.	0,25 – 0,3 %	DO 4 PUTA	28	
	PLAMENJAČE	SISTEMIK	U %: 80,00 FOSETIL	ALIFIL WG	Industrias Afrasa, S.A.	0,25 – 0,3 %	DO 4 PUTA	28	
	PLAMENJAČE	SISTEMIK	U %: 80,00 FOSETIL	AZIMUT 80 WG	Cheminova A/S	0,25 – 0,3 %	DO 4 PUTA	28	
	PLAMENJAČE CRNA PJEKAVOST I BOTRITS	SISTEMIČNO I KONTAKTNO (PREVENTIVAN, KURATIVAN I ANTISPORULANTAN)	DIMETOMORF 113 G/KG I FOLPET 600 G/KG	FORUM STAR	BASF	17,5 – 20 g /10 l	DO 4 PUTA U RAZMAKU OD 10-14 DANA	42 VINSKE 35 STOLNE	OD POČETKA CVATNJE DO FAZE ZATVARANJA GROZDA
	PLAMENJAČE CRNA PJEKAVOST	SISTEMIČNO I KONTAKTNO (PREVENTIVAN, KURATIVAN I ANTISPORULANTAN)	PROPINEB (70 %), CIMOKSANIL (6 %)	ANTRACOL COMBI WP 76	BAYER	20 – 25 g na 10 l	Do 6	42	
	PLAMENJAČE CRNA PJEKAVOST	SISTEMIČNO I KONTAKTNO	FOSETIL-AL (50) , FOLPET (25)	MIKAL FLASH	BAYER	30 – 40 g / 10 l	Do 3 puta u razmacima od 14 dana	42	OMOGUĆAVA ZAŠTITU I DUGOTRAJAN UČINAK, KOJI SE NE MOŽE USPOREDITI S

									NIJEDNIM DRUGIM FUNGICIDOM.
	PLAMENJAČE CRNA PJEGAVOST	KOMBINIRANI	FOSETIL-AL (50 %), FOLPET (25 %), IPROVALIKARB (4 %)	MIKAL F PREMIUM	BAYER	3 kg / ha	3	42	MIKAL PREMIUM F ČE VAS SPASITI I U SLUČAJU NAJPOVOLJNIJIH UVJETA ZA RAZVOJ PLAMENJAČE.
	PLAMENJAČE CRNA PJEGAVOST	SISTEMIČNO I KONTAKTNO	CIMOKSANIL 48G/L + FOLPET 480 G/L	CURZATE F	DU PONT	2,5 l/ha	DO 4	42 VINSKE 35 STOLNE	
	PLAMENJAČE, CRNA PJEGAVOST, CRNA TRULEŽ	EKOKONTAKTN	MANKOZEB 80%	DITHANE M-45	INDOFIL	20-25 g na 10 l vode	Broj tretiranja nije ograničen	42 VINSKE 21 STOLNE	
	PLAMENJAČE, CRNA PJEGAVOST, CRNA TRULEŽ	KONTAKTNI (PREVENTIVAN)	MANKOZEB 80 %	MANKOZEB		20-25 g na 10 l vode	Broj tretiranja nije ograničen	42 VINSKE 21 STOLNE	
	PLAMENJAČE, CRNA PJEGAVOST, CRNA TRULEŽ	KONTAKTNI (PREVENTIVAN)	MANKOZEB 80 %	STAR 80 WP		20-25 g na 10 l vode	Broj tretiranja nije ograničen	42 VINSKE 21 STOLNE	
	PLAMENJAČE, CRNA PJEGAVOST, CRNA TRULEŽ	KONTAKTNO (PREVENTIVNO)	MANKOZEB 80%	CADILAC 80 WP	AGRIA	20-25 g na 10 l vode		42 SA SUMPOROM 56	
	PLAMENJAČE, CRNA PJEGAVOST, CRNA TRULEŽ	KONTAKTNI (PREVENTIVAN)	MANKOZEB 80 %	PINOZEB M- 45	PINUS AGRO	20-25 g na 10 l vode	Broj tretiranja nije ograničen	42 VINSKE 21 STOLNE	
	PLAMENJAČE, CRNA PJEGAVOST, CRNA TRULEŽ	KONTAKTNO (PREVENTIVNI)	MANKOZEB 80 %	STAR 80 WP	INDOFIL	20-25 g na 10 l vode	2 puta uz razmak od najmanje 21 dan	28	
	PLAMENJAČE, CRNA PJEGAVOST, CRNA TRULEŽ	KONTAKTNO (PREVENTIVNO)	MANKOZEB 75 %	PENNZOZEB 75 DG	UPL	20-25 g na 10 l vode	RAZMAK IZMEĐU TRETIRANJA 10 – 12 DANA	28	
	PLAMENJAČE, CRNA PJEGAVOST, CRNA TRULEŽ	KONTAKTNI (PREVENTIVAN)	MANKOZEB 75 %	DITHANE DG NEOTEC	INDOFIL	20-25 g na 10 l vode	Broj tretiranja nije ograničen	42 VINSKE 21 STOLNE	
	PLAMENJAČE, CRNA PJEGAVOST, CRNA TRULEŽ	KONTAKTNI (PREVENTIVAN)	MANKOZEB 75 %	Penncozeb 75 DG	ORCHEM	20-25 g na 10 l vode	Broj tretiranja nije ograničen	28	
	PLAMENJAČE	KONTAKTNI (PREVENTIVAN)	PROPINEB (70 %)	ANTRACOL 70 WG	BAYER	20 g na 10 l	DO 2 PRIJE CVATNJE	56	
	PLAMENJAČE, CRNA PJEGAVOST, CRNA TRULEŽ	KONTAKTNI (PREVENTIVAN)	METIRAM 800 G/KG	POLYRAM DF	BASF	20 - 25 g / 10 l	PO POTREBI RAZMAK 10- 14 DANA	56	

	PLAMENJAČE, CRNA TRULEŽ	KONTAKTNO (PREVENTIVNO)	FOLPET 80 %	SOLOFOL	BELCHIM	1,5 kg/ha	5	28	NE SMIJE SE MIJEŠATI SA INSEKTICIDIMA NA OSNOVI DJELATNE TVARI DIMETOAT, ULJNIM SREDSTVIMA I SREDSTVIMA LUŽNATE REAKCIJE, UKLJUČUJUĆI I BORDOŠKU JUHU I OSTALE BAKRENE FUNGICIDE.
	PLAMENJAČE, CRNA TRULEŽ	KONTAKTNI (PREVENTIVAN)	FOLPET 80 %	FOLPAN 80 WDG	ADAMA	15 – 20 g / 10 l 20 g / 10 l	Do 4 puta	42 VINSKE 35 STOLNE	
	PLAMENJAČE, CRNA TRULEŽ	KONTAKTNO (PREVENTIVNO)	FOLPET 50 %	FUTURA 50 WP	CHROMOS AGRO	20 g na 10 l 25 g na 10 l	4	42 VINSKE 35 STOLNE	
	PLAMENJAČE BOTRITIS	KONTAKTNI (PREVENTIVAN)	U %: 8,0 + 50,0 BENALAKSIL + FOLPET	GALBEN F	FMC	200 - 250 g u 100 l	2-3	35	
	PLAMENJAČE BOTRITIS	KONTAKTNI (PREVENTIVAN)	U %: 3,75 BENALAKSIL M, 48,0 FOLPET	FANATIC F	ISAGRO	2,0 – 2,5 kg/ha	DO 3	42 VINSKE 35 STOLNE	
	PLAMENJAČE BOTRITIS	KONTAKTNI (PREVENTIVAN)	%: 60,0 + 11,3 FOLPET + DIMETOMORF	FORUM STAR	BASF	0,175 - 0,2 %	DO 5	42 VINSKE 35 STOLNE	
	PLAMENJAČE BOTRITIS I OSTALE	KONTAKTNI I SISTEMIK	U %: 50.0 FOSETIL 25.0 FOLPET 4.0 CIMOKSANIL	MOMENTUM TRIO	Adama Agan Ltd.	od 0,3 % (300 g na 100 l vode)	DO 6 PUTA U RAZMAK OD 10 DANA	42 VINSKE 35 STOLNE	
	PLAMENJAČE BOTRITIS I OSTALE	KONTAKTNI I SISTEMIK	U %: 60.0 FOLPET, 11.3 DIMETOMORF	SPHINX EXTRA 685 WDG	Adama Makhteshi m Ltd.	1,8 do 2,0 kg/ha	DO 3 RAZMAK 10- 12 DANA	28	
	PLAMENJAČE	KONTAKTNI (PREVENTIVAN)	U %: 65,0 + 8,0 MANKOZEB + BENALAKSIL	GALBEN	FMC	0,2 - 0,25 %	DO 3 RAZMAK 10- 14 DANA	42 VINSKE 35 STOLNE	
	PLAMENJAČE	KONTAKTNI (PREVENTIVAN)	U %: 20.0 AMISULBROM	LEIMAY	0,375 L/ha	0,375 L/ha	DO 2 PUTA U RAZMAKU OD 10 DANA	28	
	PLAMENJAČE	SISTEMIČNO I KONTAKTNO	50 G/L MANDIPROPAMID 600 G/L MANKOZEB	PERGADO MZ	SYNGENTA	0,25 kg /100 lit 25 g /10 lit	3	42 SA SUMPOROM 56	

	PLAMENJAČE	KOMBINIRANI PREVENTIVNI	MANKOZEB 66,7 % ZOKSAMID 8,3 %	ELECTIS WG	Gowan Comércio Internacional e Serviços	1,5 - 1,8 kg/ha	3	42 VINSKE 28 STOLNE	
	PLAMENJAČE	SISTEMIČNO I KONTAKTNO	MANKOZEB 465 G/KG CIMOKSANIL 40 G / KG	KAIROS M	CHROMOS AGRO	2,4 – 3,0 kg / ha	DO 4 PUTA UZ RAZMAK 7 -10 DANA	28	
	PLAMENJAČE	SISTEMIČNO I KONTAKTNO	AMETEOKTRADIN 300 G/L DIMETMORF 225G/L	ORVEGO	BASF	0,8 l/ha		35	
	PLAMENJAČE I PEPELNICE	SISTEMIČNO (PREVENTIVNO)	250G/L AZOKSISTROBIN	QUADRIS	SYNGENTA	1l / ha	2 PUTA U RAZMAKU OD 10-14 DANA	35	KOD VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA PRSKANJE TREBA PROVODITI ILI U RANIM JUTARNJIM ILI RANIM VEČERNJIM SATIMA.
	PLAMENJAČE I PEPELNICE	KONTAKTNO SISTEMIČNO	FOSETIL-AL (66,7 %), FENAMIDON (4,44 %)	VERITA	BAYER	25 -30 g / 10 l	Do 3 puta u razmacima od 14 dana	42	
	PLAMENJAČE PEPELNICE CRNE PJEKAVOSTI	KOMBINIRANI	FOLPET 70 % TRIADIMENOL 1,5%	SHAVIT F 72 WG	MAGAN	30 g na 80 l	DO 3 PUTA	42 VINSKE 35 STOLNE	
	PLAMENJAČE I PEPELNICE (PORATNO CRNA TRULEŽ, CRNA PJEKAVOST, CRVENA PALEŽ	KONTAKTNO I DJELOMIČNO SISTEMIČNO (PREVENTIVNO)	50 G/KG PIRAKLOSTROBIN I 550 G/KG METIRAM	CABRIO TOP	BASF	20 g / 10 l	DO 3 PUTA U RAZMAKU OD 10-14 DANA	35	NAJBOLJE UPOTRIJEBITI PREVENTIVNO
	PLAMENJAČE	SISTEMIČNO I KONTAKTNO	DIMETOMORF 90 G/KG I MANKOZEB 600 G/KG	ACROBAT MZ WG	BASF	25 g / 10 l	NAJVIŠE DO 5 PUTA U RAZMAKU OD 10-14 DANA	42	
	PLAMENJAČE	SISTEMIČNO I KONTAKTNO (KURATIVNO)	50G/L METALAKSIL-M 400G/L FOLPET	RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG	SYNGENTA	20 g / 10 l	3		PRVO TRETIRANJE OBAVITI PRED CVATNJU, A OSTALA 2 NAKON CVATNJE U RAZMAKU 10-14 DANA.
	PLAMENJAČE	SISTEMIČNO I KONTAKTNO (KURATIVNO)	%: 50.0 FOLPET, 1.75 BENTIAVALIKARB	VINACARE	o Adama Makhteshim Ltd.	1,6 do 2,0 kg/ha,	3	28	

	PLAMENJAČE	SISTEMIČNO KONTAKTNO I REZIDUALNO	38,8 G/KG METALAKSIL-M 640G/KG MANKOZEB	RIDOMIL GOLD MZ PETITE	SYNGENTA	25 g / 10 l	4	28	OD POČETKA INTENZIVNOG RASTA MLADICA, PA SVE DO FAZE ZATVARANJA GROZDA U RAZMACIMA OD 10– 14 DANA
	PLAMENJAČE	KOMBINIRANI PREVENTIVNI FUNGICID	ZOKSAMID 40 G/L TRIBAZIČNI BAKRENI SULFAT 266,6 G/L	AMALINE FLOW	NUFARM	2,5 do 2,8 l/ha	2	28	
	PLAMENJAČE	KOMBINIRANO	FLUOPIKOLID (4,4 %), FOSETIL-AL (66,7 %)	PROFILER	BAYER	250-300 g sredstva na 1000 m ² uz utrošak 800- 1000 l vode/ha	DO 3 PUTA U RAZMACIMA 12 – 14 DANA	42	
	PEPELNICA GRINJE ŠIŠKARICE	KONTAKTNO (PREVENTIVNI)	80,0 % SUMPOR	THIOVIT JET WG	SYNGENTA	30 g / 10 l (preventivno) 30 – 50 g / 10 l (pojava bolesti)		35 Za mješavine s ditiokarbamatni m fungicidima: karenca iznosi 56 dana za vinovu lozu.	
	PEPELNICA GRINJE ŠIŠKARICE	KONTAKTNO (PREVENTIVNI I KURATIVAN)	80,0 % SUMPOR	CHROMOSU L 80	BASF	30 g / 10 l (preventivno) 30 – 50 g / 10 l (pojava bolesti)	NAJVIŠE DO 4 PUTA INTERVAL 10 – 14 DANA	ISTO	PRIPRAVAK SE NE SMIJE KORISTITI 21 DAN PRIJE I POSLIJE UPOTREBE ULJNIH SREDSTAVA. TREBA IZBJEGAVATI PRIMJENU U PUNOJ CVATNJI LOZE. NE MIJEŠA SE SA PROPAMOKARBOM, KAPTANOM, HEPTENOFOSOM, ULJNIM SREDSTVIMA, BUPIRIMATOM I FOLPETOM.
	PEPELNICA	KONTAKTNO (PREVENTIVNI)	80,0 % SUMPOR	KALINOSUL 80 WG	AGROSTULIN	30 g / 10 l (preventivno) 30 – 50 g / 10 l (pojava bolesti)		ISTO	

	PEPELNICA	KONTAKTNO (PREVENTIVNI)	80,0 % SUMPOR	SULFOLAC 80 WG	AGROSTULIN	30 g / 10 l (preventivno) 30 – 50 g / 10 l (pojava bolesti)		ISTO	
	PEPELNICE GRINJE ŠIŠKARICE	KONTAKTNO (PREVENTIVNI I KURATIVAN)	80,0 % SUMPOR	COSAVET DF	agrochem	30 g / 10 l (preventivno) 30 – 50 g / 10 l (pojava bolesti)		35	NA TEMPERATURAMA ISPOD 10°C BIOLOŠKO DJELOVANJE JE OSLABLJENO ZBOG ZNATNO MANJE HLAPIVOSTI SUMPORA, A NA TEMPERATURAMA IZNAD 28°C MOŽE IZAZVATI BLAGU FITOTOKSIČNOST
	PEPELNICA	KONTAKTNO (PREVENTIVNI)	80,0 % SUMPOR	KOSSAN WG	PINUS AGRO	30 g / 10 l (preventivno) 30 – 50 g / 10 l (pojava bolesti)		ISTO	
	PEPELNICA	KONTAKTNO (PREVENTIVNI)	80,0 % SUMPOR	KUMULUS	BASF	- 0,3 - 0,5 %		ISTO	
	PEPELNICA	KONTAKTNO (PREVENTIVNI)	KVINOKSIFEN 250 G/L	CRYSTAL	DOW	1,5-2 ml sredstva u 10 l vode	3	28	
	PEPELNICA	KONTAKTNO (PREVENTIVNI)	MEPTIL-DINOKAP 350 G/L	KARATHENE GOLD 350 EC	DOW	5-6 ml u 10 l vode		42	
	PEPELNICE	LOKAL SISITEMIČNO	TRIFLOKSISTROBI N (50 %)	ZATO 50 WG	BAYER	110 g / ha	2	35	
	PEPELNICE	SISTEMIK	4,0 TETRAKONAZOL	DOMARK ME	ISAGRO	0,6 - 0,75 l/ha		35	

	PEPELNICE	SISTEMIK	%: 50.0 SPIROKSAMIN	o SPIROX	Arysta Lifescience Benelux Sprl	600 ml/ha (60 ml/1000 m2)	DO PUTA UZ RAZMAK 7 – 16 DANA	35 VINSKO 14 STOLNO	
	PEPELNICE	(PREVENTIVNI I KURATIVAN)	PIRIOFENON 300 G/L	KUSABI	BELCHIM	- 0,25-0,3 L/h	2		U POKUSIMA U EUROPI KUSABI JE UVIJEK MEĐU NAJBOLJIM PREPARATIMA – VRLO POUZDAN I UČINKOVIT • UČINKOVITO DJELOVANJE NA SIVU PLIJESAN
	PEPELNICE	SISTEMIČNO (PREVENTIVNO I KURATIVNO)	100 G/L PENKONAZOL	TOPAS 100 EC	SYNGENTA	2,5 ml / 10 l	4 PUTA U RAZMAKU OD 10-12 DANA	35	SREDSTVO TREBA KORISTITI U VRIJEME NAJJAČEG PRITISKA BOLESTI TJ. NEPOSREDNO PRIJE I NEPOSREDNO POSLIJE CVATNJE VINOVE LOZE. NE PREPORUČA SE PRIMJENJIVATI SREDSTVO TIJEKOM CIJELE VEGETACIJE SAMO.
	PEPELNICE	SISTEMIČNO (PREVENTIVAN I KURATIVAN)	METRAFENON 500 G/L	VIVANDO	SYNGENTA	2 ml / 10 l	3	28	OD POČETKA CVATNJE DO ZATVARANJA BOBA
	PEPELNICE	SISTEMIČNO (PREVENTIVAN I KURATIVAN)	KREZOKSIM-METIL 500 G/KG	STROBY DF	BASF	1,5-3 g / 10 l	3 PUTA U RAZMAKU OD 10-14 DANA	35	S PRVOM PRIMJENOM POČETI PRIJE ILI NA POČETKU CVATNJE
	PEPELNICE	SISTEMIČNO I TRANSLAMINIRANO	FLUOPIRAM: 200 G/L; TEBUKONAZOL: 200 G/L	LUNA EXPERIENC E	BAYER	0,375 l/ ha	2	14	NA SVE STADIJE PEPELNICE
	PEPELNICE	SISITEMIK	U %: 20,0 PROKVINAZID	TALENDO	DU PONT	250 ml preparata /ha	DO 3	28	

PEPELNICE	SISTEMIČNO (PREVENTIVAN I KURATIVAN)	MIKLOBUTANIL 125 G/L	FOND 12 E	ADAMA	Prije cvatnje 1,5 ml / 10 l Poslije cvatnje 2,5 na 10 l	2-3	35	
PEPELNICE	SISTEMIČNO (PREVENTIVAN)	PROPIKONAZO L 250 G/L	BUMPER 25 EC	ADAMA	20 ml sredstva u 70 – 100 l	Do 3 puta	14	NE MJEŠATI S KONTAKTNIM
PEPELNICE	SISTEMIČNO KONTAKTNI	MIKLOBUTANIL 45 G/L I KINOKSIFEN 45 G/L	POSTALON 90 SC	DOW	10 -12,5 ml na 10 l	Do 4 puta	35	
PEPELNICE	SISTEMIČNO KONTAKTNI	TRIFLOKSISTROBI N (25 %), TEBUKONAZOL (50 %)	NATIVO 75 WG	BAYER	16-20 g na 1000 m ² u 100 l vode	DO 3 PUTA U RAZMACIMA 12 – 14 DANA	42	REZIDBA NEZAŠTIČENIM RUKAMA NIJE DOPUŠTENA 5 DANA NAKON TRETIRANJA.
PEPELNICE	SISTEMIČNO (PREVENTIVAN I KURATIVAN)	TEBUKONAZOL 250 G/L	TEBKIN 250 EW	SHARDA	4 ml/10 l	3 PUTA U RAZMAKU OD 14 DANA	21	NE PREPORUČA SE PRIMJENJIVATI SREDSTVO TEBKIN 250 EW PRI TEMPERATURAMA VIŠIM OD 25°C.
PEPELNICE	KOMBINIRANO (PREVENTIVNO, KURATIVNO I ERADIKTIVNO)	TEBUKONAZOL (250 G/L)	FOLYCUR EW 250	BAYER	3 ml na 10 l	Do 2 puta	42	
PEPELNICE		TEBUKONAZOL 250 G/L	MYSTIC EC	NUFARM	0,03 %	DO 2	42	
PEPELNICA	SISTEMIK	TEBUKONAZOL 200 G/L	RIZA	Cheminova A/S	0,38 L/ha,	1	14	
PEPELNICA	SISTEMIČNO I KONTAKTNO (PREVENTIVNI I KURATIVNI)	60 G/L DIFENKONAZOL 30 G/L CIFLUFENAMID	DYNALI	SYNGENTA	5-6,5 ml na 10 lit	2 PUTA U RAZMAKU OD 10 DANA	21	OD TRI LISTA DO FAZE ŠARANJA
PEPELNICE	SISTEMIČNO KONTAKTNI (PREVENTIVNO, KURATIVNO I ERADIKTIVNO)	TEBUKANOZOL (167 G/L ± 10 G/L), SPIROKSAMIN (250 G/L ± 15 G/L), TRIADIMENOL (43 G/L ± 4,3 G/L)	FALCON EC 460	BAYER	3-4 ml / 10 l	Do 2 puta	42	

	PEPELNICE BOTRITIS	SISTEMIČNO (PREVENTIVAN I KURATIVAN)	200 G/L BOSKALID I 100 G/L KREZOKSIM-METIL	COLLIS	BASF	3-4 ml / 10 l	3 PUTA U RAZMAKU OD 10-14 DANA	28	OD POČETKA CVATNJE DO ZATVARANJA BOBA
	BOTRITIS	KONTAKTNI	FENHEKSAMID, 500 G/L	TELDOR SC 500	BAYER	10 – 15 ml na 10 l	2	21 vinska 14 stolna	
	BOTRITIS (SEKUNDARNE GLJIVICE)	SISTEMIČNO I KONTAKTNO (PREVENTIVAN)	BOSKALID 500 G/KG	CANTUS	BASF	10 – 12g / 10 l	2	28	KRAJ CVATNJE I ZATVARANJE GROZDA
	BOTRITIS	SISTEMIČNO I KONTAKTNO	375 G/L CIPRODINIL 250 G/L FLUDIOKSONIL	SWITC 62,5 WG	SYNGENTA	8 g / 10 l	2	21	. PRVI PUTA SE PRIMJENJUJE U VRIJEME CVATNJE, A DRUGI PUTA KADA DOLAZI DO PROMJENE BOJE I MEKŠANJA BOBICA
	BOTRITIS	SISTEMIČNO I KONTAKTNO	U %: 75,0 CIPRODINIL	CHORUS 75 WG	SYNGENTA	400 - 600 g/ha	2	21	PRIMJENOM PRVI PUTA KRAJEM CVATNJE I DRUGI PUTA PRIJE ZATVARANJA GROZDOVA.
	BOTRITIS	KONTAKTNO	IRIMETANIL 300 G/L	BORTRIL 300 SC		200-250 ml preparata u 100 l vode	2	21	
	BOTRITIS	KONTAKTNI	U %: 50,00 IPRODION	DRIZA WG	Industrias Afrasa, S.A.	1 – 1,5 kg/ha	2	28	
	BOTRITIS	KONTAKTNI	KAPTAN 80 %	MERPAN 80 WDG		20 g na 10 l	Može se najviše pet puta koristiti tijekom vegetacije	21	NIJE DOZVOLJENO MIJEŠANJE S KISELIM INSEKTICIDIMA (DIKLORFOS, HEPTENOFOS, DIMETOAT), ULJNIM SREDSTVIMA, KALCIJ POLISULFIDOM I BAKRENIM FUNGICIDIMA.
	BOTRITIS	PREVENTIVNI I KURATIVNI FUNGICID, POVRŠINSKOG I TRANSLAMINARNOG DJELOVANJA	PIRIMETANIL 400 G/L	PYRUS 400 SC	AGROCHEM	(200-250 ml na 1000 m ²) uz utrošak 1000 l/ha vode.		28	JEDINI BOTRITICID N A TRŽIŠTU S IZRAŽENIM PLINOVITIM DJELOVANJEM
	BOTRITIS	KONTAKTNO (PREVENTIVNI)	500 G/KG FLUDIOKSONIL	GEOXE	SYNGENTA	800-1000 l/ha	2 PUTA U RAZMAKU OD 21 DANA	21 VINSKE 7 STOLNE	OD FENOFAZE (70%OTPALIH CVIJETOVA) DO

									KRAJA CVATNJE TE U FAZI MEKŠANJA I DOZRIJEVANJA BOBICA
	BOTRITIS	KONTAKTNO (PREVENTIVNI)	U %: 50.0 IPRODION	SABUESO	Proplan Plant Protection	1,5 kg/ha.	1	21 VINSKE 14 STOLNE	
	BOTRITIS	KONTAKTNO (PREVENTIVNI)	U %: 50,00 FLUOPIRAM	LUNA PRIVILEGE	BASF	0,05% uz utrošak vode od 1000 l/ha)	DU 2 PUTA U RAZMAKU OD 12 DANA		SREDSTVO SE KORISTI U FAZI OD ZATVARANJA GROZDA DO ZRIOBE
	CIKADE I ŠIRI SPEKTAR	SISTEMIČNO (PERZISTENTNO)	250 g/kg Tiametoksam	ACTARA 25 WG	SYNGENTA	2 g / 10 l	2	28	ISKLUČIVO NAKON CVATNJE
	PEPELJASTI I ŽUTI GROZDOV MOLJAC AMERIČKI CVRČAK	KONTAKTNO (ŽELUČANO)	Deltametrin (25 g/L)	DECIS 2,5 EC	BAYER	0,5 l / ha	2	21	
	GUSJENICA PEPELJSTOG MOLJCA, ŽUTOG GROŽDANOG MOLJCA, AMERIČKOG CVRČKA I LOZINOG ZELENOG CVRČKA	KONTAKTNI, ŽELUČANI I DIŠNI INSEKTICID.	5,0 + 50,0 cipermetrin + klorpirifos etil	CHROMORE L D	CHROMOS AGRO	0,4 l/ha		21	
	PEPELJASTI I ŽUTI GROZDOV MOLJAC, CVRČKA		esfenvalerat 50 g/l	SUMIALFA 5 FL	SAS	3 ml u 10 l		21	
	PEPELJASTI I ŽUTI GROZDOV MOLJAC, CIKADA	KONTAKTNI	Indoksakarb 150 g/l	AVAUNT 15 SC	DU PONT	0,025% uz utrošak vode od 1000 litara/ha		14	
	KOMBINIRANI INSEKTICID, AMERIČKI CVRČAK		5,0 cipermetrin, 50,0 klorpirifos	NURELLE D	Arysta Lifescience Benelux Sprl				
	AMERIČKI CVRČAK		50,00 % cipermetrin	CYTHRIN MAX	Arysta Lifescience Benelux Sprl				

	AMERIČKI CVRČAK	PRIRODNO KONTAKTNI	Čisti piretrin 4,00 g/100 g (=35,6 g/l)	ASSET		70-100 ml / ha			
	ŠTITASTE UŠI	SISTEMIČNO	Spirotetramat (100 g/l)	MOVENTO 100 SC	BAYER	7,5 -9,5 / 10 l	2	21	
	PEPELJASTI I ŽUTI GROZDOV MOLJAC	KONTAKTNO (ŽELUČANO)	9,5 g/kg Emamektin benzoat (1,0 %)	AFFIRM	SYNGENTA	15 g / 10 l	3 PUTA U RAZMACIMA OD 14 DANA	7	OD POČETKA CVATNJE DO ZRIOBE BOBA
	PEPELJASTI I ŽUTI GROZDOV MOLJAC, CRVENOG VOĆNOG PAUKA, KOPRIVINE GRINJE, ŽUTOG LOZINOGR PAUKA	KONTAKTNO (ŽELUČANO)	18 g/l Abamektin	VERTMEC 018 EC	SYNGENTA	7,5 ml / 10 l 5,5 ml / 10 l		28	RADNA ZABRANA: 7 DANA NAKON PRSKANJA NE SMIJE SE RADITI NEZAŠTIĆENIM RUKAMA (REZIDBA). 24 SATA NAKON PRSKANJA NE SMIJE SE ULAZITI U NASAD.
	PEPELJASTI I ŽUTI GROZDOV MOLJAC, AMERIČKOG CVRČKA	KONTAKTNO (ŽELUČANO)	Klorpirifos-metil 225 g/l	RELDAN 22 EC		15 l /ha	Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od najmanje 14 dana.	21	KOD PRIMJENE SREDSTVA PRIJE CVATNJE, SREDSTVO SE SMIJE PRIMJENJIVATI NAJKASNIJE 7 DANA PRIJE CVATNJE.
	GRINJE	KONTAKTNO (ŽELUČANO)	tebufenpirad 200 g/kg	MASAI	BASF	0,5 kg/ha	2	14	
	GROZDOV MOLJAC	KONTAKTNO (ŽELUČANO)	alfa-cipermetrin 100 g/l	FASTAC 10 EC	BASF	1,2 – 1,5 ml / 10 l	1- 2	7	
	PEPELJASTI I ŽUTI GROZDOV MOLJAC, CVRČKA	KONTAKTNO (ŽELUČANO)	DELTAMETRIN 25 g/ l	ROTOR SUPER 250 ME		500 ml / ha	Do 3 PUTA U RAZMACIMA OD 14 DANA	7	
	PEPELJASTI I ŽUTI GROZDOV MOLJAC, KOPRIVINE GRINJE, ŽUTI LOZNI PAUK, CRVENI VOĆNI PAUK	KONTAKTNO (ŽELUČANO)	1,8 abamektin	KRAFT 18 EC	Cheminova A/S	0,5 - 0,75 l/ha		28	

	ŽUTI LOZNI PAUK, CRVENI VOČNI PAUK	KONTAKTNO I DIGESTIVNO, LARVICIDNO I OVICIDNO	11,0 etoksazol	ZOOM 11 EC	○ SUMITOMO	2,5 ml u 10 l vode			PRIJE CVATNJE
	PEPELJASTI I ŽUTI GROZDOV MOLJAC,		20,00 klorantraniliprol	CORAGEN	DU PONT	0,015 - 0,018% utrošak vode: 1000 l vode/ha		30	
	PEPELJASTI I ŽUTI GROZDOV MOLJAC,		u %: B.t.k. (16000 I.U./ mg)	BIOBIT WP	Valent BioSciences Corporation	100-150 g u 100 l vode	2	21 VINSKE 7 STOLNE	NE MOGU SE MIJEŠATI SA BAKRENIM, ULJANIM I LUŽNATIM SREDSTVIMA.
	PEPELJASTI I ŽUTI GROZDOV MOLJAC,		u %: 24,0 metoksifenozid	Runner 240 SC	○ Dow Agro	40 ml/100 l vode	DO 2 PUTA UZ RAMAK 14-21 DAN		
	JAJA CRVENOG VOČNOG PAUKA	SELEKTIVNI AKARACID	Klofentezin 500 g/l	APOLLO 50 SC		4 g / 10 l		42	
	CRVENOG VOČNOG PAUKA, KOPRIVINE GRINJE	KONTAKTNI AKARACID	Fenazakvin 200 g/l	DEMITAN		10 – 12,5 ml / 10 l			NAKON PRIMJENE SREDSTVA NE ULAZITI U NASADE BEZ ZAŠTITNE ODJEĆE I OBUĆE 48 SATI I 7 DANA NE RADITI NA REZIDBI NEZAŠTIĆENIM RUKAMA
	GRINJE	KONTAKTNI AKARACID	Spirodiklofen (240 g/L)	ENVIDOR SC 240	BAYER	0,04%	1	14	
	CRVENOG VOČNOG PAUKA, KOPRIVINE GRINJE	SISTEMIČNI AKARACID	Tebufenpirad 200 g/kg	MASAI	BAYER	0,1-0,4 kg / h	Do dva puta	21 STOLNE 14 VINSKE	
					○				